

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ KIM PHƯỢNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Kim Phượng, ngày tháng 01 năm 2025

V/v hướng dẫn phòng chống rét cho
cây trồng vụ Xuân và phòng trừ dịch bệnh
cho cây trồng dịp tết Nguyên đán Ất Ty
năm 2025

Kính gửi:

- Các ban ngành liên quan;
- Các xóm trên địa bàn xã.

Thực hiện Công văn số 09/NN&PTNT ngày 22/01/2025 của Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Định Hoá về việc hướng dẫn phòng chống rét cho cây trồng vụ Xuân và phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng dịp tết Nguyên đán Ất Ty năm 2025.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 01 đến tháng 02/2025 và gây ra các đợt rét đậm, rét hại, nhiệt độ giảm sâu, thấp nhất phổ biến từ 7 - 10⁰C, vùng núi Bắc Bộ từ 3 - 6 độ C. Ngoài rét đậm, rét hại còn kèm theo hiện tượng sương muối.

Hiện nay, cây lúa Xuân đang giai đoạn mạ, cây chè giai đoạn đôn, một số diện tích sản xuất chè Đông đang giai đoạn phát triển búp, cây vải, nhãn giai đoạn phát triển nụ hoa, cây rau họ hoa thập tự giai đoạn phát triển thân lá, cà chua, khoai tây phát triển củ, quả.

Căn cứ tình hình thời tiết và sinh trưởng cây trồng, UBND xã Kim Phượng đề nghị các ban ngành liên quan, các xóm chủ động hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng vụ Xuân năm 2025 và chủ động phòng trừ các đối tượng dịch hại trên cây trồng như sau:

1. Cây lúa

Đối với mạ Xuân:

- Tuyệt đối không gieo mạ những ngày nhiệt độ dưới 15⁰C.
- Đối với những ruộng mạ mới gieo phải làm khung vòm phủ kín bằng nilon trắng 100% cho diện tích mạ; Luôn giữ ẩm cho mạ bằng cách giữ nước ở rãnh, tuyệt đối không để mạ bị khô hạn. Rắc tro bếp lên trên mặt luống để giữ ẩm cho mạ.
- Khi nhiệt độ trên 15⁰C: Tiến hành gieo đối với thóc giống đã ngâm ủ nảy mầm. Sau gieo cần che kín nilon trắng để giữ ẩm và ẩm tạo điều kiện cho mạ nhanh mọc. Khi mạ được 1 lá thật, thường xuyên giữ đủ ẩm; tiến hành mở dần nilon 2 đầu luống mạ, tuyệt đối không bón phân đạm, NPK cho mạ. Trước cây 2 - 3 ngày phải mở hết nilon để mạ được thích nghi với môi trường tự nhiên, cây khi mạ đạt 3-3,5 lá.
- Trong những ngày có sương muối giá buốt, cần tưới nước trên mặt lá làm tan sương để tránh hiện tượng cháy lá khi có ánh nắng. Cần dự phòng giống lúa có

thời gian sinh trưởng ngắn ngày để sẵn sàng gieo cấy bổ sung cho những diện tích mạ, lúa mới cấy chết rét.

- Thường xuyên kiểm tra bệnh đạo ôn trên ruộng mạ, lúa, phun phòng bệnh khi gặp điều kiện thời tiết âm u, độ ẩm cao, rét nhẹ. Khi phát hiện bệnh cần tiến hành phun thuốc trừ bệnh được trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam như: Fuji-One 40EC, 40WP; Amistar Top® 325SC; Katana 20SC; Daconil 75WP...

2. Cây chè

Chú ý theo dõi phát hiện sớm bệnh phòng lá xuất hiện gây hại:

- Với chè vườn ươm: Vệ sinh vườn sạch sẽ, bón phân cân đối, điều chỉnh mái che thông thoáng trong vườn ươm.

- Với chè kinh doanh: Thực hiện bón phân cân đối, dừng bón phân khi bệnh xuất hiện.

- Sử dụng các loại thuốc trừ bệnh được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam như: Stifano 5.5SL; Starsuper 20WP; Manage 5WP...

3. Cây nhãn, vải

Chủ động theo dõi những vườn nhãn, vải đang trong giai đoạn phát triển nụ hoa, quả non, phát hiện kịp thời bệnh sương mai, thán thư hại vải, nhãn, tỉa bớt các chùm hoa quá dày, các nhánh hoa ở phần đầu và phần cuối chùm hoa, hướng dẫn nông dân phun phòng bệnh trong điều kiện thời tiết thuận lợi cho bệnh phát triển (trời mưa ẩm). Sử dụng các loại thuốc trừ bệnh được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam: Bệnh thán thư như: Daconil 500SC; Lilacter 0.3 SL; Mdancozeb 640 WP; Stonegold 22WP; Manage 5WP Bệnh sương mai như Arygreen 75 WP, 500SC; Insuran 50WG; Lilacter 0.3 SL; Antracol 70WP...

4. Cây rau họ hoa thập tự, cà chua, khoai tây

Đối với diện tích rau màu đã đến kỳ thu hoạch cần khẩn trương thu hoạch ngay. Đối với nhóm rau ăn lá cần che bằng nilon trắng để tránh mưa rét. Tưới đủ ẩm theo nhu cầu dinh dưỡng của từng cây trong những ngày rét đậm. Bón thêm phân kali, phân lân, giảm bón đạm, phun hoặc tưới một số chế phẩm sinh học để cây khỏe mạnh tăng cường khả năng chống rét. Theo dõi diễn biến tình hình sâu bệnh trên cây trồng để có biện pháp phòng chống kịp thời các đối tượng sau:

** Bệnh thối nhũn*

Phát hiện sớm và nhổ bỏ cây bị bệnh ra khỏi vùng trồng rau, ngừng bón phân. Sử dụng các loại thuốc trừ bệnh được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam ví dụ như: Agrilife 100SL; Stifano 5.5SL ...

** Với bệnh sương mai cà chua, khoai tây*

Chủ động phun phòng bệnh khi điều kiện thời tiết thuận lợi cho bệnh phát triển (trời âm u, mưa ẩm). Sử dụng các loại thuốc trừ bệnh được đăng ký trong Danh

mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam như: Daconil 75WP, 500SC; Amistar® 250 SC; Newtracon 70 WP ...

** Sâu xanh bướm trắng, sâu tơ*

Chủ động kiểm tra mật độ sâu để phòng trừ khi mật độ sâu xanh trên 6 con/m², mật độ sâu tơ trên 20 con/m², phun khi sâu tuổi nhỏ. Sử dụng các loại thuốc trừ sâu được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam như: Aremec 45EC; Catex 3.6EC; BP Dy Gan 5.4EC; Azaba 0.8EC; Fimex 36EC...

Chú ý: + Sử dụng thuốc BVTV phải đảm bảo thời gian cách ly.

+ Nông độ, liều lượng theo hướng dẫn trên nhãn thuốc.

5. Đối với cây lạc, đậu tương, ngô xuân

Không gieo trồng khi nhiệt độ thấp dưới 15⁰C kéo dài cho dù thời vụ gieo trồng đã đến.

Trên đây là một số nội dung chỉ đạo, hướng dẫn phòng chống rét cho cây trồng vụ Xuân và phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng dịp tết Nguyên đán Ất Ty năm 2025, đề nghị các ban ngành liên quan, các xóm phối hợp chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Dũng